

八色西瓜通信

緊急情報2

～土壤内水分不足に注意！

状態を見ながら、かん水を！

裂果・病害虫によるロス果削減～

令和7年7月4日

八色西瓜生産組合指導部

J A みなみ魚沼園芸畜産課

南魚沼農業普及指導センター



○**水分不足による葉のしおれ、果形不良が目立っています。**

○特に6月20日以降に除覆したほ場は、ほとんど雨が降っておらず、水分不足の傾向。

→今後の天気を確認し、雨が降らなそうな場合は、気温が低い早朝・夕方にかん水。

→ 1週間に2回ほど(3~4日あける)、50株あたり 500~800ℓ(1株あたり 10ℓ)を
目安にかん水しましょう。

小玉は
特に注意！

○「**裂果**」の主要因は、

肥大期の極端な乾湿差。

→土壤が極端に乾かないよう、様子を見ながら定期的にかん水し、肥大をうながしましょう。



病害虫発生・早めの防除を！

○高温・乾燥の影響で、アブラムシ類・
オオタバコガ・ハダニの発生が多い傾向。

→今後多くの発生が予想されますので、
殺虫剤を殺菌剤とあわせて散布してください。

【殺虫剤】

RACコード	薬剤名	オオタバコガ	ウリノメイガ	ハスモンヨトウ	ハダニ類	アブラムシ類
29	ウララDF					○
9B	チェス顆粒水和剤					○
25A	ダニサラバフロアブル				○	
30	グレーシア乳剤	○	○	○	○	
28	フェニックス顆粒水和剤	○	○	○		
28	プレバソンフロアブル5	○				

【殺菌剤】

RACコード	薬剤名	炭そ病	つる枯病	菌核病	褐色腐敗病
40+M5	プロポーズ顆粒水和剤	○			○
M7	ベルクートフロアブル	○	○	○	
1	ベンレート水和剤	○	○	○	
M7+19	ポリベリン水和剤	○	○		
11+7	シグナムWDG	○	○	○	○

※収穫前使用可能時期・回数等、確認してから使用ください。

○果実の生育ステージにあわせて展着剤を選びましょう。

機能性	展着剤名	使用時期
なし	ハイテンパワー	着果期
固着	K.Kステッカー	着果期～肥大期 (降雨前のコーティング)
	アビオナーE	
浸透	アプローチBI	肥大期～収穫期 (発病時)
	ニーズ	

※注意※

- ・光たま期は、展着剤を使用しないこと。
- ・浸透性の展着剤は農薬との相性に特に注意！

不明な点・指導が必要な場合は、下記までご連絡ください。

J A みなみ魚沼 園芸畜産課 関、戸田 TEL : 777-3180
南魚沼農業普及指導センター 野本 TEL : 772-3337